

ÜRÜN	UYGULAMA ZAMANI	DOZU (Yapraktan)
Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Çeltik	Kardeşlenme döneminde yabancı ot ilacı ile birlikte ve başaklanma başlangıcında 2 defa uygulanır.	100-150 cc / da
Şeker Pancarı, Havuç, Soğan	Bitki yaprakları 2-3 adet olunca ve 2. çapadan sonra 15 gün ara ile 3-4 defa uygulanır.	100-150 cc / da
Fasulye, Bezelye	Ekimden 3 hafta sonra 10 gün ara ile 3-4 defa uygulanır.	100-150 cc / da
Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık	İlk tomurcuk, ilk çiçek başlangıcında, meyve halinde 3-4 defa uygulanır.	100-150 cc / da
Şeftali, Kayısı, Elma, Kiraz, Erik, Armut	Çiçeklenme öncesi %50, çiçeklendiğinde ve 10-15 gün ara ile 3-4 defa uygulanır.	100-150 cc /100 lt
Pamuk	Tarak yaprağı oluşumunda, çiçek açma aşamasında ve meyve oluşurken uygulanır.	100-150 cc / da
Lahana, Karnabahar	Dikimden 4-6 hafta sonra, 7-10 gün ara ile 3-4 defa uygulanır.	100-150 cc / da
Mısır, Ayçiçeği	Bitki çiçek açmadan önce ve sonrasında çiçekte iken 3-4 defa uygulanır.	100-150 cc / da
Kavun, Karpuz	Çiçeklenme öncesi ve sonrası 2 defa uygulanır.	100-150 cc / da
Mercimek, Nohut	Çiçeklenmeden önce ve sonra 2 defa uygulanır.	100-150 cc / da
Bag	Çiçeklenme öncesi %50, çiçeklendiğinde dane teşekkülü başlayınca 3-4 defa uygulanır.	100-150 cc /100 lt
Antep Fıstığı	Çiçek döktükten 20-25 gün sonra meyve bağlama döneminden önce olmak üzere 3-4 defa uygulanır.	100-150 cc /100 lt
Zeytin	Çiçeklenmeden önce, ilk çiçek aşamasında ve çiçeklenmeden sonra 3-4 defa uygulanır.	100-150 cc /100 lt
Kimyon	3-4 çatal döneminde yabancı ot ilacıyla birlikte kullanılır. Ekimden hasada kadar 3-4 defa uygulanabilir.	100-150 cc / da
Çilek	Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme başlangıcında ve sonrasında olmak üzere 3-4 defa uygulanabilir.	100-150 cc / da
Portakal	Meyve yanakları pembeleşmesini tamamlamadan önce 2 defa uygulanır.	100-150 cc /100 lt
Patates	Sap uzaması aşaması, tomurcuk ve çiçek aşamasında 3 defa uygulanır.	100-150 cc / da
Tütün	Fide yastıktayken 1 defa, tarlaya alındıktan sonra 10 gün ara ile 2-3 defa uygulanır.	100-150 cc / da
Fındık	İlk uygulama meyve tutumu döneminde, daha sonraki uygulamalar 20 gün ara ile toplam 3-4 defa uygulanır.	100-150 cc /100 lt
Süs Bitkileri	Yeterli yaprak yüzeyi oluştuğunda 20-30 gün aralıklarla uygulama yapılır.	100-150 cc /100 lt

Uygulama serin rüzgarsız ortamda yapılmalıdır. Aşırı sıcakta, yağmur öncesi ve sonrasında yapılmamalıdır. ACTIVE PLUS kuvvetli alkaliler dışında zirai mücadele ilaçları ile karıştırılabilir. Uygulama yapraklar ıslanuncaya kadar ince zerrecikler halinde yapılır. Düşük doz ve sık uygulama önerilir.

Kullanılmadan önce ayrı bir kaptaki ürünün iyice çözülmesi sağlanmalıdır. Yukarıdaki miktarlar topraktan verildiği takdirde dekara 1-1,5 lt'ye kadar verilebilir. Yukarıdaki miktarlar üreticiyi yönlendirmek amacı ile yapılan tavsiyelerdir. Bitkilerin büyüklük, küçüklük ve eksikliğinin derecesine göre uygulanacak miktar artırılabilir veya azaltılabilir.

TAAHHÜT: Piyasaya sunacağım etiketin aynısı olduğunu taahhüt ederim. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyorum.

EC FERTİLİZER

KALSIYUM NİTRAT ÇÖZELTİSİ YAPRAKTAN UYGULAMA İÇİN ACTIVE PLUS

GARANTİ EDİLEN ANALİZ (W/W):

Toplam Azot (N) ————— %8
Nitrat Azotu(NO₃-N) ————— %8
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit(CaO) ————— %14
Suda Çözünür Bor (B) ————— %1
pH ————— 7-9

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ
MASKE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ
UYGULAMA SIRASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ
DERİ VE GÖZ İLE TEMASTAN KAÇININIZ

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ

DEPOLAMA DURUMU:

Serin ve kuru şartlarda ve orijinal ambalajında depolandığı takdirde fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde en az 3 yıl bir değişiklik olmaz.

+5 °C ve +30 °C sıcaklık arasında muhafaza ediniz.

Hatalı depolama ve uygulamalarda sorumluluk kabul edilmez.

Gübrenin normal şartlar veya etiketinde belirtilen uygulama dozajı dışında veya anormal şartlar veya kullanılmasından doğacak sorunlardan Firmamız mesul değildir.

FİRMA BEYANI:

Üretici firma; gübrenin uygun olmayan koşullarda muhafazası veya tavsiye dışı kullanımından doğacak zararlardan sorumlu değildir. Orijinal ambalajında satılmak şartı ile üretici firma ürünün kalitesini garanti eder.

Lisans No. :

Tescil No. :

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi :

Parti No :

Son Kullanma Tarihi. Üretim Tarihinden İtibaren 3 Yıldır.

Net Ağırlık :1.10 Kg
Hacim : 1 Lt

TESCİL SAHİBİ FİRMA:

FEN TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK ve
SU ÜRÜNLERİ TİCARET İTH. İHR. ve SAN.LTD.ŞTİ.

Adres: Şafak Mah. 4260 Sok. No: 21/5

ANTALYA

Tel: 0 242 226 23 95 Fax: 0 242 226 23 98

FEN TARIM ÜR. HAYV. VE SU ÜR.
TİC. İTH. İHR. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Şafak Mah. 4260 Sokak 21/5 ANTALYA
Tel:0.242. 226 23 95 Fax:0.242 226 23 98
Kurumlar V.D. 385 049 4736

