

# EC FERTİLİZER

## ASSAD Fe

### DEMİRLİ GÜBRE ÇÖZELTİSİ (Demir Sülfat İçerikli)

**GARANTİ EDİLEN İÇERİK** (% W/W)

**Suda Çözünür Demir (Fe)** % 5

**Net: 1,27 KG HACİM: 1 LT**

#### DEPOLAMA DURUMU:

Serin ve kuru şartlarda ve orijinal ambalajında depolandığı takdirde fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde en az 5 yıl bir değişiklik olmaz. +5 °C ve +40 °C sıcaklık arasında muhafaza ediniz. Hatalı depolama ve uygulamalarda sorumluluk kabul edilemez. Ürünün normal şartlar veya etiketinde belirtilen uygulama dozajı dışında veya anormal şartlar veya kullanılmamasından doğacak sorunlardan firmamız mesul değildir.

Lisans No. : 910  
Tescil No. :  
Üretim Tarihi :  
Parti No :  
Son Kullanma Tarihi : Üretim Tarihinden  
İtibaren 5 Yıldır.

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.  
Göz ve Deriye teması halinde bol su ile yıkayınız.  
Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.  
Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.  
Kullanmadan önce çalkalayınız.  
Yutmayınız ve teneffüs etmeyiniz.  
Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz.  
Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.

#### ÜRETİCİ TESCİL SAHİBİ FİRMA:

FEN TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK VE  
SU ÜRÜNLERİ TİCARET İTH. İHR. VE SAN. LTD. ŞTİ.  
Adres: Şafak Mah. 4260 Sok. No: 21/5 ANTALYA  
Tel: 0 242 226 23 95 Fax: 0 242 226 23 98

**FEN TARIM ÜRÜNLERİ**  
**HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ**  
Tic. İth. İhr. Ve San. Ltd. Şti.  
**Şafak Mah. 4260 Sok. No: 21/5 ANTALYA**  
**Kurumlar V.D. 385 049 4736**

**Durmuş DEMİREL**  
Şirket Vekili

**Dikkatli. Tahrir Edicidir.**

| ÜRÜNLER                                            | UYGULAMA ZAMANI                                           | MİKTARI                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| göster pancarı,                                    | 3-5 yapraklı dönemde 20 gün sonra                         | 100 cc / dönüm                      |
| ayçiçeği, pamuk                                    | 3-5 yapraklı dönemde hasat sonuna kadar                   | 100 cc / dönüm                      |
| misir                                              | bitki 30 cm olduğunda hasat sonuna kadar                  | 100 cc / dönüm                      |
| Baklagiller, yerfıstığı, patates, kinoa            | çiçeklenme öncesinde 20 gün sonra                         | 100 cc / dönüm                      |
| kavun, karpuz, hububat                             | 3-5 yapraklı dönemde hasat sonuna kadar                   | 100 cc / dönüm                      |
| çilek                                              | şarjına sırasında çiçeklenme öncesinde hasat sonuna kadar | 200 cc / 100 lt suya ve 2-4 l/dönüm |
| Yonca, korunga, fig                                | her biçimden sonra, ilk çıkıştan 30 gün sonra             | 100 cc / dönüm                      |
| turunçgiller, elma, armut                          | çiçeklenme öncesinden hasata kadar                        | 200 cc / 100 lt suya yapraklı       |
| erik, kiraz, şeftali, kayısı, incir, zeytin, ceviz | gözetin uyanma döneminden hasata kadar                    | 200 cc / 100 lt suya yapraklı       |
| üzüm                                               | sürgün 20 cm olduğunda çiçeklenme öncesi                  | 200cc / 100 lt suya yapraklı        |
| muz                                                | ilk baharda büyüme baş 20 gün sonra hasata kadar          | 200cc / 100 lt suya yapraklı        |
| nar, kivi                                          | çiçeklenme öncesi, çiçeklenme sonrası                     | 200cc / 100 lt suya yapraklı        |
| domates, patlıcan, biber, salatalık, acur          | 3-5 yapraklı dönemde ilk meyve oluştuğunda 20 gün sonra   | 200cc / 100 lt suya yapraklı        |
| karnabahar, brokoli, lahan, marul                  | 3-5 yapraklı dönemde 20 gün sonra baş oluşumu sırasında   | 100 -200cc / 100 lt suya yapraklı   |
| soğuk pırasa, havuç, turp                          | çimlenmeden 20 gün sonra her 20 günde bir                 | 100 -200cc / 100 lt suya yapraklı   |
| enginar                                            | bitki 30 cm olduğunda baş oluşumunda                      | 100 -200cc / 100 lt suya yapraklı   |
| maydanoz ve diğer yeşillikler                      | 3-5 yapraklı dönemde 20 gün sonra ilk kesimde             | 100 -200cc / 100 lt suya yapraklı   |

#### UYGULAMA ZAMANI:

ASSAD Fe'nin en iyi uygulama zamanı, ilkbaharda ağaçların uyanmaya başladığı devredir. Meyve bahçeleri ve fidanlıkarda erken ilkbaharda tohumcu ve çiçekler açılmadan uygulanabilir. ASSAD Fe'nin köklere kolayca ulaşabilmesini sağlamak için köklerin bulunduğu bölgelerde kanal açılarak da uygulanabilir. Yoğun sulama yapılan yerlerde tavsiye edilen dozu 2'ye bölüp 1 uygulamayı vegetatif gelişimin başında, 2 uygulamayı da meyve tutumundan hemen sonra yapmak önerilir.

Piyasaya sunacağımız ürünlerin üzerindeki etiket bilgilerinin aynı olacağına göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederim.

