

ÜRÜN	UYGULAMA ZAMANI	DOZU (Yapraktan)
Bugday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Çeltik	Kardeşlenme döneminde yabancı ot ilacı ile birlikte ve başaklanma başlangıcında 2 defa uygulanır.	100-150 gr / da
Şeker Pancarı, Havuç, Soğan	Bitki yaprakları 2-3 adet olunca ve 2. çapadan sonra 15 gün ara ile 3-4 defa uygulanır.	100-150 gr / da
Fasulye, Bezelye	Ekimden 3 hafta sonra 10 gün ara ile 3-4 defa uygulanır.	100-150 gr / da
Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık	İlk tomurcuk, ilk çiçek başlangıcında, meyve halinde 3-4 defa uygulanır.	100-150 gr / da
Şeftali, Kayısı, Elma, Kiraz, Erik, Armut	Çiçeklenme öncesi %50, çiçeklendiğinde ve 10-15 gün ara ile 3-4 defa uygulanır.	100-150 gr / 100 lt
Pamuk	Tarak yaprağı oluşumunda, çiçek açma aşamasında ve meyve oluşurken uygulanır.	100-150 gr / da
Lahana, Karnabahar	Dikimden 4-6 hafta sonra, 7-10 gün ara ile 3-4 defa uygulanır.	100-150 gr / da
Mısır, Ayçiçeği	Bitki çiçek açmadan önce ve sonrasında çiçekte iken 3-4 defa uygulanır.	100-150 gr / da
Kavun, Karpuz	Çiçeklenme öncesi ve sonrası 2 defa uygulanır.	100-150 gr / da
Mercimek, Nohut	Çiçeklenmeden önce ve sonra 2 defa uygulanır.	100-150 gr / da
Bag	Çiçeklenme öncesi %50, çiçeklendiğinde dane teşekkülü başlayınca 3-4 defa uygulanır.	100-150 gr / 100 lt
Antep Fıstığı	Çiçek döktükten 20-25 gün sonra meyve bağlama döneminden önce olmak üzere 3-4 defa uygulanır.	100-150 gr / 100 lt
Zeytin	Çiçeklenmeden önce, ilk çiçek aşamasında ve çiçeklenmeden sonra 3-4 defa uygulanır.	100-150 gr / 100 lt
Kimyon	3-4 çatal döneminde yabancı ot ilacıyla birlikte kullanılır. Ekimden hasada kadar 3-4 defa uygulanabilir.	100-150 gr / da
Çilek	Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme başlangıcında ve sonrasında olmak üzere 3-4 defa uygulanabilir.	100-150 gr / da
Portakal	Meyve yanakları pembeleşmesini tamamlamadan önce 2 defa uygulanır.	100-150 gr / 100 lt
Patates	Sap uzaması aşaması, tomurcuk ve çiçek aşamasında 3 defa uygulanır.	100-150 gr / da
Tütün	Fide yastıktayken 1 defa, tarlaya alındıktan sonra 10 gün ara ile 2-3 defa uygulanır.	100-150 gr / da
Fındık	İlk uygulama meyve tutumu döneminde, daha sonraki uygulamalar 20 gün ara ile toplam 3-4 defa uygulanır.	100-150 gr / 100 lt
Süs Bitkileri	Yeterli yaprak yüzeyi oluştuğunda 20-30 gün aralıklarla uygulama yapılır.	100-150 gr / 100 lt

Uygulama serin rüzgarsız ortamda yapılmalıdır. Aşırı sıcakta, yağmur öncesi ve sonrasında
yapılmamalıdır.COMBİ-ONE kuvvetli alkaliler dışında zirai mücadele ilaçları ile karıştırılabilir.
Uygulama yapraklar ıslanmaya kadar ince zerrecikler halinde yapılır.
Düşük doz ve sık uygulama önerilir.

Kullanılmadan önce ayrı bir kaptaki ürünün iyice çözülmesi sağlanmalıdır. Yukarıdaki miktarlar
topraktan verildiği takdirde dekara 1-1,5 Kg' a kadar verilebilir. Yukarıdaki miktarlar üreticiyi
yönlendirmek amacı ile yapılan tavsiyelerdir. Bitkilerin büyüklük, küçüklük ve eksikliğinin
derecesine göre uygulanacak miktar artırılabilir veya azaltılabilir.

TAAHHÜT: Piyasaya sunacağım etiketin aynısı olduğunu taahhüt ederim.
Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyorum.

EC FERTİLİZER

Bor(B), Bakır(Cu), Demir(Fe), Manganez(Mn) ve
Çinko(Zn)

MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

COMBİ-ONE

GARANTİ EDİLEN ANALİZ (W / W):

Suda Çözünür Bor(B)-----%1
Suda Çözünür Bakır(Cu)-----%1
Suda Çözünür Demir (Fe)-----%5
Suda Çözünür Manganez(Mn)-----%3
Suda Çözünür Çinko(Zn)-----%7

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ
MASKE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ
UYGULAMA ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ
DERİ VE GÖZ İLE TEMASTAN KAÇININIZ

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ

TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR

DEPOLAMA DURUMU:

Serin ve kuru şartlarda ve orijinal ambalajında depolandığı
takdirde fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde en az
3 yıl bir değişiklik olmaz.

+5 °C ve +30 °C sıcaklık arasında muhafaza ediniz.

Hatalı depolama ve uygulamalarda sorumluluk kabul edilmez.

Gübre normal şartlar veya etiketinde belirtilen uygulama
dozajı dışında veya anormal şartlar veya kullanılmasıyla
doğacak sorunlardan Firmamız mesul değildir.

FİRMA BEYANI:

Üretici firma; gübrenin uygun olmayan koşullarda muhafazası
veya tavsiye dışı kullanımından doğacak zararlardan sorumlu
değildir. Orijinal ambalajında satılmak şartı ile üretici firma
ürünün kalitesini garanti eder.

Lisans No. :

Tescil No. :

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi :

Parti No. :

Son Kullanma Tarihi, Üretim Tarihinden İtibaren 3 Yıldır.

Net : 1 Kg

TESCİL SAHİBİ FİRMA:

FEN TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK ve
SU ÜRÜNLERİ TİCARET İTH. İHR. ve SAN. LTD. ŞTİ.
Adres: Gürsu Mah. 349 Sok. No: 2 Kat: 1 Daire: 3
ANTALYA

Tel: 0242 229 40 48 Faks: 0242 228 42 38

FEN TARIM ÜRÜNLERİ

HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ
TİCARET İTH. İHR. ve SAN. LTD. ŞTİ.
Tel: 0242 229 40 48 Fax: 228 42 38
Kurumlar V.D. 385 049 4736

DOĞAN ÖZGÜR ŞENTÜRK

