

Endüstri Bitkileri	Uygulama Zamanı	Yapraktan Uygulama	Damlamadan
Şekerpancarı	1) 3-5 yapraklı dönemde 2) 20 gün sonra	100 gr / 100 lt su 100 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg
Ayçiçeği	1) 3-5 yapraklı dönemde 2) 20 gün sonra	100 gr / 100 lt su 100 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg
Mısır	1) 3-5 yapraklı dönemde 2) Hasat sonuna kadar	100 gr / 100 lt su 100 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg
Pamuk	1) Bitki 30 cm olduğunda 2) Hasat sonuna kadar	100 gr / 100 lt su 100 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg
Tarla Bitkileri	Uygulama Zamanı	Yapraktan Uygulama	Damlamadan
Baklagiller-Yeşil fasıly	1) Gelişme döneminde 2) 20 gün sonra	100 gr / 100 lt su 100 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg
Potates	1) Çiçeklenme sonunda 2) 20 gün sonra	100 gr / 100 lt su 100 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg
Hububat	1) 3-5 yapraklı dönemde 2) Hasat sonuna kadar	100 gr / 100 lt su 100 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg
Kimyon	1) Çiçeklenme öncesinde 2) 20 gün sonra	100 gr / 100 lt su 100 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg
Kavun-Karpuz	1) 3-5 yapraklı dönemde 2) Hasat sonuna kadar	100 gr / 100 lt su 100 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg
Çilek	1) Şaşırtma sırasında 2) Çiçeklenme öncesinde 3) Hasat sonuna kadar	200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg
Yem Bitkileri	Uygulama Zamanı	Yapraktan Uygulama	Damlamadan
Yonca-Karunge-Fig	1) Her biçimden sonra 2) İlk çıkıştan 30 gün sonra	100 gr / 100 lt su 100 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg
Meyveler	Uygulama Zamanı	Yapraktan Uygulama	Damlamadan
Turnigiller, Elma, Armut, Kiraz, Şeftali, kavu, anar, zeytin, ceviz	Çiçeklenme öncesinden hasata kadar Gölzerin uyanmasından hasata kadar	200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg
Üzüm	1) Sürgün 20 cm olduğunda 2) Çiçeklenme öncesi 3) Çiçeklenme sonrası	100 -200 gr / 100 lt su 100 -200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg
Kıvı	1) İlk baharda büyüme boy 2) 20 gün sonra 3) Hasata kadar	100 -200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg
Nar-Kıvı	1) Çiçeklenme öncesi 2) Çiçeklenme sonrası	100 -200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg
Sebzeler	Uygulama Zamanı	Yapraktan Uygulama	Damlamadan
Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık	1) 3-5 yapraklı dönem 2) İlk meyve oluşupunda 3) 20 gün sonra	200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg
Karnabahar, Brokoli, Lahana, Marul	1) 3-5 yapraklı dönem 2) 20 gün sonra 3) Baş oluşumu sırasında	100 -200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg
Sogan, Pırasa, Havuç, Turp	1) Çiçeklenmeden 20 gün sonra 2) Her 20 günde bir	100 -200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg
Enginar	1) Bitki 30 cm olduğunda 2) Baş oluşumunda	100 -200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg
Mayada noz ve diğer yopuliller	2) 20 gün sonra 3) İlk kesimde	100 -200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg
Seralar	Uygulama Zamanı	Yapraktan Uygulama	Damlamadan
Tom, sebzeler	1) Dikimde 2) Hasata kadar	100 -200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg
Sus Bitkileri	Uygulama Zamanı	Yapraktan Uygulama	Damlamadan
Armut, Çilek	1) Dikimde 2) 20 gün sonra sonraki her 10 günde	100 -200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg
Armut, Çilek	1) Dikimde 2) 20 gün sonra sonraki her 10 günde	100 -200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg

EC FERTİLİZER

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

VİSNA 20-20-20

GARANTİ EDİLEN İÇERİK (W/W):

Toplam Azot (N)	% 20
Amonyum Azotu (N)	% 3,8
Üre Azotu (N)	% 16,2
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)	% 20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 20

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

UYARILAR

- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- *Göz ve deriye temas etmesi halinde bol su ile yıkayınız.
- *Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- *Uygun doz oranlarını kesinlikle aşmayınız.
- *Yutmayınız ve teneffüs etmeyiniz.
- *Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz.

ÇÖZÜNERBİLİRLİĞİ VE KARIŞABİLİRLİĞİ

Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde kalıntı bırakmaz. İnsektisit, fungusit, herbisit ve yaprak gübrelere ile karışabilir. Üretici firma uygulama yapılmadan önce ön karışım yapılmasını tavsiye eder.

Ürünü kullanmadan önce etiket ile aynı ölçüde kullanın. Etiket üzerindeki talimatları dikkatle okuyunuz. Ürünü kullanırken koruyucu giysi kullanınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Serin ve kuru şartlarda ve orijinal ambalajında depolayınız.

Takdirde fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde en az

5 yıl bir değişiklik olmaz.

+5 °C ve +45 °C sıcaklık arasında muhafaza ediniz.

Hatalı depolama ve uygulamalarda sorumluluk kabul edilmez.

Gübrelerin normal şartlar veya etiketinde belirtilen uygulama

dozajı dışında veya anormal şartlar veya kullanımlarından

doğarak sorunlardan Firmamız mesul değildir.

Lisans No:

Tescil No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Parti No:

Son kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Net Ağırlık:

ÜRETİCİ FİRMA: CAT SAIGNER S.A.
Ctra. Valencia, Km 5,900 50410
Zaragoza- İSPANYA

İTHALATÇI FİRMA:
FEN TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK VE SU
ÜRÜNLERİ TİC.İTH.İHR.VE SAN.LTD.ŞTİ. Şafak Mah.
4260 Sok. No:21/5 ANTALYA
TEL: 0 242 226 23 95
FAXS: 0 242 226 23 98

FEN TARIM ÜRÜNLERİ
HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ
Tic. İth. İhr. Ve San. Ltd. Şti.
Şafak Mah. 4260 Sok. No: 21/5 ANTALYA
Kurumlar V.D. 385 049 4736

24841