

Endüstri Bitkileri	Uygulama Zamanı	Yapraktan Uygulama	Damlamadan
Şekerpancarı	1) 3-5 yapraklı dönemde 2) 20 gün sonra	100 gr / 100 lt su 100 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.
Ayçiçeği	1) 3-5 yapraklı dönemde 2) 20 gün sonra	100 gr / 100 lt su 100 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.
Mısır	1) 3-5 yapraklı dönemde 2) Hasat sonuna kadar	100 gr / 100 lt su 100 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.
Pamuk	1) Bitki 30 cm olduğunda 2) Hasat sonuna kadar	100 gr / 100 lt su 100 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.
Tarda Bitkileri	Uygulama Zamanı	Yapraktan Uygulama	Damlamadan
Baklagiller-Yerfıstığı	1)Çeşme döneminde 2) 20 gün sonra	100 gr / 100 lt su 100 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.
Patates	1) Çiçeklenme sonunda 2) 20 gün sonra	100 gr / 100 lt su 100 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.
Hububat	1) 3-5 yapraklı dönemde 2) Hasat sonuna kadar	100 gr / 100 lt su 100 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.
Kimyon	1) Çiçeklenme öncesinde 2) 20 gün sonra	100 gr / 100 lt su 100 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.
Kavun-Karpuz	1) 3-5 yapraklı dönemde 2) Hasat sonuna kadar	100 gr / 100 lt su 100 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.
Çilek	1)Şaşırtma sırasında 2) Çiçeklenme öncesinde 3)Hasat sonuna kadar	200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.
Yem Bitkileri	Uygulama Zamanı	Yapraktan Uygulama	Damlamadan
Yonca-Korunga-Fığ	1.) Her biçimden sonra 2)İlk çıkıştan 30 gün sonra	100 gr / 100 lt su 100 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.
Meyveler	Uygulama Zamanı	Yapraktan Uygulama	Damlamadan
Elma, Armut, Kiraz, Şeftali, kayısı, incir, zeytin, ceviz	Çiçeklenme öncesinden hasata kadar Gölzerin uyanmasından hasata kadar	200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.
Üzüm	1.Sürgün 20 cm olduğunda 2. Çiçeklenme öncesi 3.Çiçeklenme sonrası	100-200 gr / 100 lt su 100-200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.
Alma	1.İlk baharda büyüme baş. 2.20 gün sonra 3. Hasata kadar	100-200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.
Nar-Kivi	1)Çiçeklenme öncesi 2. Çiçeklenme sonrası	100-200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.
Sebzeler	Uygulama Zamanı	Yapraktan Uygulama	Damlamadan
Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık	1. 3-5 yapraklı dönem 2. İlk meyve oluşupunda 3. 20 gün sonra	200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.
Karnabahar, Brokoli, Lahana, Marul	1. 3-5 yapraklı dönem 2. 20 gün sonra 3. baş oluşumu sırasında	100-200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.
Soğan, Brasa, Havuç, Turp	1. Çiçeklenmeden 20 gün sonra 2. Her 20 günde bir	100-200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.
Enginar	1. Bitki 30 cm olduğunda 2. Baş oluşumunda	100-200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.
Maydanoz, yedigöze, yeşillikler	2. 20 gün sonra 3. İlk kesimde	100-200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.
Seralar	Uygulama Zamanı	Yapraktan Uygulama	Damlamadan
Tüm sera bitkileri	1) Dikimde 2) Hasata kadar	100-200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.
Sis Bitkileri	Uygulama Zamanı	Yapraktan Uygulama	Damlamadan
Kırmızı Çilek	1. Dikimde 2. 20 gün sonra sonraki her 10 gün	100-200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.
Yem bitkileri	1. Nisan başında 2. Haziran başında 3. Eylül başında	100-200 gr / 100 lt su	1000 m2 1-2 Kg.

EC FERTİLİZER

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ VİSNA 10-05-40

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

W/W):

Toplam Azot (N)	% 10
Amonyum Azotu (N)	% 2,9
Üre Azotu (N)	% 7,1
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5)	% 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)	% 40

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

UYARILAR

- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- *Göz ve deriye temas etmesi halinde bol su ile yıkayınız.
- *Sadece grekli olan yerlerde kullanınız.
- *Uygun doz oranlarını kesinlikle aşmayınız.
- *Yutmayınız ve teneffüs etmeyiniz.
- *Kullanılmış boş ambalajları imha ediniz.

ÇÖZÜNERBİLİRLİĞİ VE KARIŞABİLİRLİĞİ
Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde kalıntı bırakmaz. İnsektisit, fungusit, herbisit ve yaprak gübreleri ile karışabilir. Üretici firma uygulama yapılmadan önce ön karışım yapılmasını tavsiye eder.

Etiketteki tavsiye edilen doz ve uygulama talimatlarına dikkat ediniz. Etiket üzerindeki talimatları dikkatlice okuyunuz. Etiket üzerindeki talimatları dikkatlice okuyunuz.

DEPOLAMA DURUMU:

Serin ve kuru şartlarda ve orijinal ambalajında depolanır. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde en az 5 yıl bir değişiklik olmaz.

+5 °C ve +45 °C sıcaklık arasında muhafaza ediniz. Hatalı depolama ve uygulamalarda sorumluluk kabul edilmez.

Gübrelerin normal şartlar veya etiketinde belirtilen uygulama dozajı dışında veya anormal şartlar veya kullanılmasıyla doğacak sorunlardan Firmamız mesul değildir.

Lisans No:
Tescil No:
Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Parti No:
Son kullanım tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
Net Ağırlık:

ÜRETİCİ FİRMA: CAT SAIGNER S.A.
Ctra. Valencia, Km 5,900 50410
Zaragoza- İSPANYA

İTHALATÇI FİRMA:
FEN TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK VE SU
ÜRÜNLERİ TİC. İTH. İHR. VE SAN. LTD. ŞTİ. Şafak Mah.
4260 Sok. No:21/5 ANTALYA
TEL: 0 242 226 23 95
FAXS: 0 242 226 23 98

FEN TARIM ÜRÜNLERİ
HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ
Tic. İth. İhr. Ve San. Ltd. Şti.
Şafak Mah. 4260 Sok. No: 21/5 ANTALYA
Kurumlar V.D. 385 049 4736

24843